

# 预防蚊虫叮咬！ 提示和建议

携带西尼罗河病毒和寨卡等疾病的蚊子可以在容器内繁殖。

## 清除院子里的积水以消除蚊子滋生地。

蚊子可以在小如瓶盖的容器内繁殖。控制院内蚊子最有效的方式是清除蚊子可以产卵的积水。

能收集并保留积水至少一周的任何物体可以被视为潜在的滋生地。查看以下周刊：

- ✓ 用于排水管排水的黑色波纹管
- ✓ 水桶、喷壶、瓶盖或任何能容水的垃圾
- ✓ 轮胎
- ✓ 鸟浴和宠物饮水盆
- ✓ 带垫盆的盆栽
- ✓ 儿童玩具
- ✓ 放在木柴堆和园林设备上的防水布
- ✓ 烤架和天井的家具罩
- ✓ 独轮手推车
- ✓ 阳台和门廊下的容器
- ✓ 垃圾桶、回收筒和其它桶
- ✓ 船和船罩



- 有关院内积水的提示和建议。倒掉积水、丢掉容器或将容器放入室内。
- 每月检查天沟一次以清除落叶及残渣，并保证水流畅通。
- 如果无法倒掉容器内的水，比如观赏水池，请使用诸如苏云金杆菌以色列变种之类的杀幼虫剂处理容器（遵循标签说明）。



Fairfax County Health Department  
A Fairfax County, Va., publication. 06/2016.  
如需本信息的其它格式，  
请拨打 703-246-2411（TTY 为 711）与卫生部联系。