

治療 COVID-19 新冠疾病可以防止高危險群的患者住院

[及時了解](#)疫苗接種並繼續實施[分層預防策略](#)對於阻止 COVID-19 新冠病毒疾病在我們社區的傳播仍然至關重要。接種疫苗不僅可以預防 COVID-19 新冠疾病，而且如果您確實被感染，還可以減輕疾病的嚴重程度。但是，如果您選擇不接種疫苗或即使在接種疫苗之後仍然生病，並且由於您年齡較大或患有慢性疾病而面臨更高的風險怎麼辦？治療這時候就顯得格外重要。

如果您[很可能因 COVID-19 新冠病毒而病情加重](#)，現在可以使用有效的治療方法來防止病情惡化所導致的住院和死亡。較易生病的人包括[老年人](#)、[患有慢性疾病](#)或免疫系統較弱的人、超重的人和懷孕的婦女。有幾種類型的治療可以採用，它們可以在不同的時間或不同的病患組中使用。與您的醫療保健提供者諮詢，以獲取更多關於選項內容的信息。在這些選擇中，美國國立衛生研究院 (NIH) 的一個專家小組將 Paxlovid (帕克洛維) 確定為首選的療法，並有強有力的證據支持其使用。在一項隨機臨床試驗中，帕克洛維 (Paxlovid) 在預防高危患者因 COVID-19 新冠病毒住院或死亡方面的有效率為 88%。在該試驗中，接受帕克洛維 (Paxlovid) 的人沒有死亡，而接受安慰劑的人中有 12 人死亡。

費郡衛生區(Fairfax Health District)分享以下有關 COVID-19 新冠治療的信息：

1. 如果您的檢測結果呈陽性並且是老年人或會因 COVID-19 新冠病毒而[增加重症風險](#)的人，則可以[進行治療](#)。在檢測呈陽性後聯繫醫療保健提供者，以確定您是否有資格接受治療，即使您只有輕度或中度症狀。您還可以訪問 [「一站式從篩檢到治療」\(Test to Treat\)](#) 地點，如果符合條件，可以從該地點的提供者獲得處方。
2. 遵循疾控中心 [CDC 關於 COVID-19 新冠檢測的指導](#) 並使用[治療定位器 \(Treatment Locator\)](#) 或致電 [1-800-232-0233](#) (TTY [1-888-720-7489](#)) 尋找檢測地點，如果您檢測呈陽性，可以提供治療。
3. **不要拖延**：必須在症狀出現後的五天內開始治療。
4. 隨時關注 [疫苗最新資訊](#) **接種 COVID-19 新冠疫苗** 仍然是預防 COVID-19 新冠疾病嚴重後果（包括嚴重疾病、住院和死亡）的最佳方法。

無論您是否有健康保險，治療 COVID-19 新冠的藥物都是免費的。雖然片劑（如 帕克洛維 Paxlovid）是免費的，但輸液或注射 單克隆抗體 (monoclonal antibody) 產品可能需要支付部分

費用 co-pay。對於在藥房診所使用「一站式從篩檢到治療」Test to Treat 計劃的人，健康保險 (包括 Medicaid)將支付諮詢費用；沒有醫療保險的人將需自己負責諮詢費。

點擊[此處](#) 查找有關 COVID-19 新冠病毒治療和療法的更多信息。