

محافظت نوزادان در برابر RSV

ویروس سین سیثیال تنفسی یا RSV (respiratory syncytial virus)، یک ویروس تنفسی معمولی است که شش‌ها و مجراهای تنفسی را تحت فشار قرار می‌دهد. فصل RSV در خزان شروع و در زمستان در ایالات متحده U.S. به اوج خود می‌رسد.



این ویروس از طریق تماس نزدیک از فردی به فردی سرایت می‌کند، از جمله زمانی که شخص مصاب سرفه و یا عطسه بزند. علائم RSV شامل سرفه، عطسه، خس خس سینه، آبریزش/بندش بینی، تب و کاهش اشتها می‌باشد. در نوزادان و افراد جوان عفونت RSV می‌تواند منجر به مریضی شدید، بستری شدن و حتی مرگ شود.

واکسین RSV

CDC دو گزینه را برای محافظت از نوزادان توصیه می‌کند. RSV: واکسین در جریان حاملگی و یا ایمن سازی انتی بادی برای نوزادان. یکی از این گزینه‌های برای محافظت از بیشتر نوزادان مورد نیاز می‌باشد.

واکسین RSV در جریان حاملگی داده می‌شود:

- در دوران 32-36 هفته حاملگی توصیه می‌شود
- واکسین قبل از تولد به طفل منتقل می‌شود
- معمولاً در جریان ماه‌های سپتامبر - جنوری داده می‌شود



انتی بادی RSV که به طفل داده می‌شود:

- مستقیماً از طفل محافظت می‌کند
- به اطفال بالاتر از 8 ماه توصیه می‌گردد
- معمولاً در جریان ماه‌های اکتوبر - مارچ داده می‌شود



- دوز انتی بادی RSV همچنین برای اطفال زیر بین سنین 8 الی 19 ماه که وارد فصل دوم RSV می‌شوند، توصیه می‌شود:
- اطفالی که به علت تولد نارس به مریضی مزمن ریوی/شش دچار می‌باشند.
 - اطفال شدیداً در برابر واکسین حساس می‌باشند
 - اطفال مبتلا به فیبروس سیستیک که مریضی شدید دارند
 - اطفال سرخ پوست امریکایی و بومی آلاسکا

در فصل RSV همیشه
آپدیت باشید



وزارت صحت واکسین RSV را برای کسانی که واجد شرایط آن هستند تشویق می‌کند. از خاطر اینکه این واکسین جدید است، ممکن است زمان گیر باشد تا در جامعه ما به دسترس قرار گیرد. **با داکتر خود در رابطه به اینکه کدام یک برای شما و طفل شما بهتر است، صحبت کنید.**

این واکسین‌ها از شیوع RSV جلوگیری نمی‌کنند، بلکه از افرادی که در برابر مریضی‌های شدید آسیب پذیر هستند، محافظت می‌کند. با انجام این عادات صحی از جمله؛ شستن دست‌ها، پوشاندن سرفه و عطسه، پاک‌سازی جاهای که مکرراً لمس می‌شوند و ماندن در خانه هنگام مریضی هرکس می‌تواند به محدود شدن شیوع RSV کمک نماید.

fairfaxcounty.gov/health/rsv